

## 7. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES)

El equipo de salud necesita conocer las garantías explícitas en salud (GES) que pueden beneficiar específicamente a la población infantil. A continuación, se presenta un cuadro resumen con ellas y el link para descargar la Guía clínica correspondiente.

### PATOLOGÍAS DEL PREMATURO

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
Retinopatía del prematuro <sup>54</sup>	Prematuros menores de 1.500 gr de peso o 32 semanas de edad gestacional	Diagnóstico, tratamiento y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acceso a confirmación diagnóstica dentro de 48 horas desde la sospecha</li> <li>– Tratamiento dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica</li> <li>– Seguimiento dentro de 30 días desde la indicación médica</li> </ul>
Hipoacusia neurosensorial del prematuro <sup>55</sup>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Examen auditivo previo al alta de neonatología (tamizaje)</li> <li>– Confirmación diagnóstica dentro de los tres meses de edad corregida ante tamizaje alterado</li> <li>– Audífono dentro de 3 meses desde la confirmación diagnóstica</li> <li>– Implante coclear dentro de 180 días desde la indicación médica</li> <li>– Primer control en 14 días desde la colocación de audífono o implante coclear</li> </ul>
Displasia broncopulmonar del prematuro <sup>56</sup>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inicio del tratamiento en 24 horas, desde la confirmación diagnóstica</li> <li>– Primer control dentro de 14 días, desde el alta hospitalaria</li> </ul>

### ENFERMEDADES CONGÉNITAS Y MALFORMACIONES

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------

<sup>54</sup> Ver Guía Clínica "[Retinopatía del prematuro](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>55</sup> Ver Guía Clínica "[Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>56</sup> Ver Guía Clínica "[Displasia broncopulmonar del prematuro](#)" (MINSAL, 2009).

<b>Cardiopatía congénita operable</b> <sup>57</sup>	Menores de 15 años	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico (confirmación o descarte) con los siguientes plazos por edad: <ul style="list-style-type: none"> <li>o A contar de las 20 semanas de gestación hasta el nacimiento: 30 días</li> <li>o Cero a siete días de vida: 48 horas</li> <li>o Siete días a dos años: 21 días</li> <li>o Dos a quince años: 180 días (6 meses)</li> </ul> </li> <li>- Tratamiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>o En casos graves operables, ingreso a prestador resolutivo dentro de 48 horas desde estabilización.</li> <li>o En otras cardiopatías operables, tratamiento quirúrgico o procedimiento, según indicación médica.</li> <li>o Dentro del primer año post alta quirúrgica, acceso a control médico</li> </ul> </li> </ul>
<b>Disrafias espinales</b> <sup>58</sup>	Nacidos/as con sospecha de disrafia espinal	Diagnóstico, tratamiento y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disrafias abiertas: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Diagnóstico en las primeras doce horas de vida</li> <li>o Tratamiento quirúrgico dentro de 72 horas post nacimiento</li> <li>o Instalación de válvulas derivativas dentro de los primeros 90 días de vida</li> <li>o Control con neurocirujano 15 días post alta</li> <li>o Rehabilitación dentro de 180 días desde indicación médica</li> </ul> </li> <li>- Disrafias cerradas: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Consulta con neurocirujano dentro de 90 días para confirmación diagnóstica.</li> <li>o Cirugía dentro de 60 días luego de la confirmación diagnóstica.</li> <li>o Control con neurocirujano 15 días post alta.</li> </ul> </li> </ul>

<sup>57</sup> Ver Guía Clínica [“Cardiopatías Congénitas Operables en menores de 15 años”](#) (MINSAL, 2010).

<sup>58</sup> Ver Guía Clínica [“Disrafias Espinales”](#) (MINSAL, 2011).

<b>Fisura labiopalatina</b> <sup>59</sup>	Desde recién Nacidos/as hasta los 15 años de edad	Diagnóstico tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmación diagnóstica por Cirujano Infantil, Máxilo-facial o Plástico en un plazo máximo de 15 días desde la sospecha.</li> <li>- Ortopedia prequirúrgica dentro de 45 días posteriores al nacimiento</li> <li>- Cirugía primaria (primera y segunda intervención) dentro de 30 días desde indicación médica</li> <li>- Cirugía secundaria, dentro de 60 días desde indicación médica</li> </ul>
---	---	-------------------------	--

#### PATOLOGÍAS DEL RECIÉN NACIDO

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido</b> <sup>60</sup>	Recién nacidos	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico inmediato al momento de la sospecha</li> <li>- Tratamiento desde el momento del diagnóstico</li> <li>- Ingreso a prestador con capacidad de resolución integral dentro de 72 horas</li> </ul>

#### SALUD ORAL

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>Salud Integral</b> <sup>61</sup> Oral	Niños y niñas de seis años	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención en 90 días desde la solicitud.</li> <li>- Alta cuando exista erupción de cuatro primeros molares definitivos.</li> </ul>

#### ENFERMEDADES AGUDAS DE LA INFANCIA

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>Infección Respiratoria Aguda Baja de manejo ambulatorio</b> <sup>62</sup>	Menores de cinco años	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratamiento farmacológico dentro de 24 horas post diagnóstico.</li> <li>- Tratamiento kinesiológico dentro de 24 horas post indicación médica.</li> </ul>

<sup>59</sup> Ver Guía Clínica "[Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido](#)" (MINSAL, 2009).

<sup>60</sup> Ver Guía Clínica "[Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido](#)" (MINSAL, 2011).

<sup>61</sup> Ver Guía Clínica "[Salud oral integral para niños y niñas de 6 años](#)" (MINSAL, 2013).

<sup>62</sup> Ver Guía Clínica "[Infección Respiratoria Aguda Baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años](#)" (MINSAL, 2013).

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario y edad	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>VIH/SIDA</b> <sup>63</sup>	Gestantes VIH+, hijos de gestantes VIH+	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de terapia antirretroviral antes de las 24 semanas de gestación (o cuando se realice el diagnóstico)</li> <li>- Tratamiento durante el parto (cuatro horas antes de la cesárea o durante el parto vaginal).</li> <li>- Tratamiento del recién nacido dentro de las 24 horas de nacido</li> </ul>
<b>Diabetes mellitus tipo I</b> <sup>64</sup>	Cualquier edad con sospecha de diabetes mellitus I	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante sospecha acceso a consulta con especialista dentro de 7 días.</li> <li>- Glicemia dentro de 30 minutos en el CES o servicio de urgencia a pacientes atendidos por descompensación</li> <li>- Tratamiento se inicia dentro de 24 horas desde confirmación diagnóstica</li> </ul>
<b>Diabetes mellitus tipo II</b> <sup>65</sup>	Cualquier edad con sospecha de diabetes mellitus II	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico en 45 días, desde toma de glicemia alterada</li> <li>- Glicemia dentro de 30 minutos en el CES a pacientes atendidos por descompensación</li> <li>- Tratamiento se inicia dentro de 24 horas post confirmación diagnóstica</li> <li>- Atención con especialista dentro de 90 días desde la derivación, según indicación médica</li> </ul>
<b>Asma bronquial moderada y grave</b> <sup>66</sup>	Menores de 15 años	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico dentro de 20 días desde la sospecha</li> <li>- Tratamiento inmediato desde la sospecha, según indicación médica</li> <li>- En caso de necesitar evaluación por especialista, se realiza dentro de los 30 días posderivación.</li> </ul>
<b>Epilepsia en el niño</b> <sup>67</sup>	Mayores de un año y	Diagnóstico y Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación por especialista en 60 días post derivación</li> </ul>

<sup>63</sup> Ver Guía Clínica "[VIH/SIDA](#)" (MINSAL, 2013).

<sup>64</sup> Ver Guía Clínica "[Diabetes mellitus tipo I](#)" (MINSAL, 2013).

<sup>65</sup> Ver Guía Clínica "[Diabetes mellitus tipo II](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>66</sup> Ver Guía Clínica "[Asma Bronquial moderada y grave en menores de 15 años](#)" (MINSAL, 2011).

<sup>67</sup> Ver Guía Clínica "[Epilepsia en el niño](#)" (MINSAL, 2008).

		menores de 15 años		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de tratamiento dentro de 7 días post diagnóstico</li> </ul>
	<b>Hemofilia</b> <sup>68</sup>	Cualquier edad	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmación diagnóstica dentro de 15 días desde la sospecha</li> <li>- Tratamiento inmediato desde la confirmación diagnóstica</li> </ul>
	<b>Insuficiencia renal crónica terminal</b> <sup>69</sup>	Cualquier edad (con necesidad de diálisis o trasplante)	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención por especialista en 60 horas luego de confirmado el diagnóstico</li> <li>- Acceso vascular para hemodiálisis dentro de 90 días post indicación</li> <li>- Acceso de peritoneodiálisis dentro de 21 días y hemodiálisis en 7 días, según indicación médica.</li> <li>- Estudio para trasplante e ingreso a lista de espera en plazo máximo de 10 meses.</li> <li>- Drogas inmunosupresoras de por vida tras trasplante.</li> </ul>
	<b>Manejo y tratamiento de la infección por virus de la Hepatitis B (VHB)</b> <sup>70</sup>	Cualquier edad	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación pre tratamiento: Dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica</li> <li>- Tratamiento dentro de 30 días desde la indicación</li> </ul>
	<b>Manejo de la infección por virus de la Hepatitis C (VHC)</b> <sup>71</sup>	Cualquier edad	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante sospecha, confirmación diagnóstica dentro de 45 días</li> <li>- Evaluación pre tratamiento: Dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica</li> <li>- Tratamiento dentro de 30 días desde la indicación</li> </ul>
	<b>Fibrosis quística</b> <sup>72</sup>	Cualquier edad	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se confirma el diagnóstico, acceso a tratamiento integral inmediato y a mantención del tratamiento en caso de haberlo iniciado</li> </ul>
<b>Artritis Juvenil</b> <sup>73</sup>	<b>Idiopática</b>	Niños y adolescentes menores de 15 años	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante confirmación diagnóstica, acceso a tratamiento dentro de 7 días</li> </ul>
	<b>Reumatoidea</b>	Cualquier edad	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante confirmación diagnóstica por</li> </ul>

<sup>68</sup> Ver Guía Clínica "[Hemofilia](#)" (MINSAL, 2005).

<sup>69</sup> Ver Guía Clínica "[Insuficiencia renal crónica terminal](#)" (MINSAL, 2005).

<sup>70</sup> Ver Guía Clínica "[Manejo y tratamiento de la infección por virus de la Hepatitis B \(VHB\)](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>71</sup> Ver Guía Clínica "[Manejo de la infección por virus de la Hepatitis C \(VHC\)](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>72</sup> Ver Guía Clínica "[Fibrosis Quística](#)" (MINSAL, 2007).

<sup>73</sup> Ver Guía Clínica "[Artritis juvenil Idiopática y reumatoidea](#)" (MINSAL, 2010).

		edad		especialista, acceso a inicio tratamiento inmediato
<b>Hipoacusia Moderada</b> <sup>74</sup>		Menores de 2 años, nacidos después desde el 2013	Tratamiento y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ante diagnóstico acceso a audífonos en un plazo de 3 meses</li> <li>– Acceso a implante coclear dentro de 180 días, ante indicación</li> <li>– Primer control dentro de 14 días, luego de colocación de audífonos o implante coclear</li> </ul>
<b>Lupus eritematoso sistémico</b> <sup>75</sup>		Cualquier edad	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Luego de la confirmación diagnóstica acceso a inicio inmediato de tratamiento farmacológico</li> </ul>

### ONCOLÓGICAS

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>Cáncer en niños menores de 15 años</b> <sup>76 y 77</sup>	Menores de 15 años con leucemia, linfoma o tumores sólidos	Diagnóstico, tratamiento y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Confirmación diagnóstica en 14 días en caso de leucemia y 37 días en caso de linfoma y tumores sólidos</li> <li>– Leucemias: Acceso a quimioterapia dentro de 24 horas desde confirmado el diagnóstico</li> <li>– Tumores sólidos y Linfomas: Quimioterapia dentro de 24 horas y radioterapia dentro de 10 días desde la indicación médica</li> <li>– Una vez finalizado tratamiento, primer control en 7 días (leucemia) y 30 días (linfoma y tumores sólidos)</li> </ul>
<b>Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos</b> <sup>78</sup>	Cualquier edad con diagnóstico de cáncer avanzado y terminal	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tratamiento en cinco días desde la confirmación diagnóstica</li> <li>– Además de los fármacos, apoyo por un equipo multiprofesional al paciente y su familia</li> </ul>

### OFTALMOLÓGICAS

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------

<sup>74</sup> Ver Guía Clínica "[Tratamiento de Hipoacusia Moderada en menor de 2 años](#)" (MINSAL, 2013).

<sup>75</sup> Ver Guía Clínica "[Lupus Eritematoso Sistémico](#)" (MINSAL, 2013).

<sup>76</sup> Ver Guía Clínica "[Linfoma y tumores sólidos](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>77</sup> Ver Guía Clínica "[Leucemia en menores de 15 años](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>78</sup> Ver Guía Clínica "[Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos](#)" (MINSAL, 2011).

<b>Estrabismo</b> <sup>79</sup>	Menores de nueve años	Diagnóstico, tratamiento y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmación diagnosticada en 90 días desde la sospecha</li> <li>- Tratamiento médico en 30 días desde la confirmación diagnóstica</li> <li>- Tratamiento quirúrgico en 90 días desde la indicación médica</li> <li>- Primer control de seguimiento en 30 días desde el alta médica</li> </ul>
<b>Tratamiento quirúrgico de cataratas</b> <sup>80</sup>	Cualquier edad con sospecha de cataratas	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante la sospecha de cataratas derivación a oftalmólogo, quien confirma el diagnóstico dentro de 180 días.</li> <li>- En caso de agudeza visual igual o inferior a 0,1: Tratamiento y corrección óptima en el mejor ojo dentro de 90 días</li> <li>- En caso de agudeza visual igual o inferior a 0,3m corrección óptica dentro de 180 días desde confirmación</li> </ul>

#### URGENCIAS INFANTILES

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>Gran quemado</b> <sup>81</sup>	Cualquier edad con quemaduras graves o que comprometan la vida	Tratamiento y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingreso a tratamiento con prestador especializado dentro de 72 horas desde la confirmación diagnóstica.</li> <li>- Primer control en 15 días desde alta médica</li> </ul>
<b>Traumatismo Cráneo Encefálico</b> <sup>82</sup>	Cualquier edad con sospecha de TEC moderado o grave	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención de urgencia con diagnóstico dentro de 12 horas desde la sospecha</li> <li>- Tratamiento dentro de 24 horas, desde la confirmación diagnóstica</li> </ul>
<b>Trauma ocular grave</b> <sup>83</sup>	Cualquier edad (golpe o penetrante con trauma grave)	Diagnóstico y tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico dentro de 12 horas desde la sospecha</li> <li>- Consulta para tratamiento con especialista dentro de 60 días</li> </ul>
<b>Hemorragia</b>	Cualquier	Diagnóstico,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmación de hemorragia con TAC en</li> </ul>

<sup>79</sup> Ver Guía Clínica "[Estrabismo en menores de 9 años](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>80</sup> Ver Guía Clínica "[Tratamiento quirúrgico de cataratas \(congénitas y adquiridas\)](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>81</sup> Ver Guía Clínica "[Tratamiento quirúrgico de cataratas \(congénitas y adquiridas\)](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>82</sup> Ver Guía Clínica "[Gran quemado](#)" (MINSAL, 2007).

<sup>83</sup> Ver Guía Clínica "[Traumatismo Cráneo Encefálico moderado o grave](#)" (MINSAL, 2013).

<b>cerebral, secundaria a ruptura aneurisma</b> <sup>84</sup>	edad, con sospecha de hemorragia cerebral	tratamiento y seguimiento	<p>24 horas desde la sospecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmación de aneurisma roto con TAC multiforme o angiografía digital en 48 horas tras confirmar hemorragia subaracnoidea.</li> <li>- Inicio del tratamiento en 24 horas en centro especializado, en caso de aneurisma roto.</li> <li>- Control con especialista para el seguimiento, dentro de 30 días.</li> </ul>
<b>Urgencias odontológicas</b> <sup>85</sup>	Cualquier edad con urgencia odontológica	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante infección grave, traumatismo dental, hemorragia bucal, aumento de volumen de la cara asociado a problema dentario o dolor muy intenso que limite actividad normal se confirma el diagnóstico y se inicia el tratamiento correspondiente.</li> </ul>
<b>Politraumatizado</b> <sup>86</sup>	Cualquier edad	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antes de 24 horas desde el recate, acceso a prestador con capacidad resolutive.</li> </ul>

## TRAUMATOLOGÍA

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
<b>Tratamiento quirúrgico de la escoliosis</b> <sup>87</sup>	Menores de 25 días	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dentro de 270 días desde confirmación diagnóstica y la indicación de cirugía</li> <li>- Primer control 10 días post alta hospitalaria</li> </ul>
<b>Displasia luxante de caderas</b> <sup>88</sup>	Lactantes menores de 1 año	Diagnóstico Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acceso a radiografía de caderas en su 3er mes de vida</li> <li>- Ante sospecha, acceso a confirmación diagnóstica por especialista dentro de 30 días</li> <li>- Tratamiento dentro de 15 días desde la confirmación diagnóstica por especialista</li> </ul>

## SALUD MENTAL

Prestación Garantizada	Grupo beneficiario	Garantía ofrecida	Beneficios y Plazos máximos
------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------

<sup>84</sup> Ver Guía Clínica "[Trauma Ocular Grave](#)" (MINSAL, 2009).

<sup>85</sup> Ver Guía Clínica "[Urgencia odontológicas ambulatorias](#)" (MINSAL, 2011).

<sup>86</sup> Ver Guía Clínica "[Politraumatizado](#)" (MINSAL, 2013).

<sup>87</sup> Ver Guía Clínica "[Tratamiento quirúrgico de la escoliosis](#)" (MINSAL, 2010).

<sup>88</sup> Ver Guía Clínica "[Displasia luxante de caderas](#)" (MINSAL, 2010).

<b>Esquizofrenia</b> 89	Cualquier edad	Diagnóstico y tratamiento desde el primer episodio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante sospecha, evaluación por especialista dentro de 20 días</li> <li>- Inicio inmediato de tratamiento desde la indicación del especialista</li> </ul>
<b>Consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas</b> 90	Menores de 20 años	Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio dentro de 10 días desde la confirmación diagnóstica</li> </ul>

## 8. SALUD AMBIENTAL INFANTIL

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.



La Organización Mundial para la Salud (OMS) [143] define la salud ambiental como:

*“Aquella disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos y psicosociales”, así como la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar en forma adversa la salud de las presentes y futuras generaciones”.*

En un sentido más restrictivo, la disciplina que involucra la identificación, tratamiento, prevención de enfermedades mediante el control de los riesgos ambientales en infantes, jóvenes y adultos, así como la creación de ambientes saludables para los niños y niñas se

<sup>89</sup> Ver Guía Clínica [“Esquizofrenia \(tratamiento desde el primer episodio\)”](#) (MINSAL, 2009).

<sup>90</sup> Ver Guía Clínica [“Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años”](#) (MINSAL, 2013).