Anemias 2^a Parte

Dr. Claudio Pinuer

Residente de Pediatría HPM

Anemia ferropénica

Claudio Sandoval MD, Uptodate junio 20 de 2019

Diagnóstico

- Prueba positiva de suplementación con Fe+
- 3 mg/kg/d fe+elemental → aumento hb
- Aumento hb 1g/lit en 4 semanas en anemias moderadas
- Aumento hb 1g/lit en 2 semanas en anemias severas

Terapia Fe⁺ oral

- Iniciar sulfato ferroso: 3mg Fe⁺ elemental / kg / día una vez por día
- Administración entre comidas con agua o jugo
- Evitar leche o té
- Ram: dolor abdominal, constipación, diarrea
- Infrecuente actualmente

Equivalencias

- 60 mg hierro elemental =
 - 300 mg sulfato ferroso heptahidratado
 - 180 mg de fumarato ferroso
 - 500 mg de gluconato ferroso

Presentaciones

- 1 ml (25 gotas) =
- 125mg sulfato ferroso heptahidratado
- 25 mg de hierro elemental

Ejemplo

- Juanito pesa 10 Kg, calcule tratamiento de anemia
- Dosis: 3 mg/kg/día hierro elemental = 30 mg
- $1 \text{ ml} = 25 \text{ gotas} = 25 \text{ mg}$ hierro elemental
- 1 gota = 1 mg hierro elemental
- Respuesta = 30 gotas

Enfermedades crónicas

Condiciones

- Bronquiectasias
- Osteomielitis
- Artritis idiopática juvenil
- Lupus
- Colitis ulcerosa
- Neoplásico
- ERC

Mecanismos

- SRE hiperactivo
(disminuye vida media eritrocitos)
- Pobre respuesta medular
- Déficit EPO

Fig. 220.4. Imagen de un esferocono (izquierda) comparado con un discocono (derecha) obtenida mediante microscopio electrónico de barrido.

Esferocitosis

Generalidades

- Causa frecuente de anemia hemolítica
- Más frecuente en norte de Europa
- Herencia autosómica dominante y mutaciones espontáneas (25%)
- Anomalía de la membrana que disminuye capacidad de deformación del GR, aumentando destrucción en el bazo

Presentación clínica

- Es un espectro
- Desde curso asintomático hasta hemólisis graves

Claves diagnósticas

- Reticulocitosis + hiperbilirrubinemia
- Antecedentes familiares
- Esplenomegalia
- Esferocitos en frotis

Manejo

- Individuos asintomáticos: No tratar
- Individuos con hemólisis intermitente: Transfusiones según necesidad
- Individuos con hemólisis crónica: Acido fólico, quelantes de Fe^{+} , transfusiones periódicas, esplenectomía.

Drepanocitosis y células falciformes

Elliot P Vichinsky, MD, Donald H Mahoney, Jr, MD, uptodate 26 de abril de 2018

Generalidades

- + 600 variantes estructurales de la hemoglobina
- Drepanocitosis es la más frecuente de éstas variantes
- Hb S homocigota = anemia de células falciformes
- Hs S heterocigota = genera portadores asintomáticos

Presentación clínica

- Hemólisis crónica intensa
- Masas de hematíes falciformes generan isquemia
- Sd coronario agudo, priapismo, secuestro esplénico, infecciones

Manejo

- Prevención y tratamiento de complicaciones
- Crisis de dolor: hidroxiurea, L-glutamina
- Curativo: trasplante de células madre

Talasemias

Edward J Benz, Jr, MD, Emanuele Angelucci, MD, uptodate 2 de abril de 2019

Generalidades

- Espectro heterogéneo de anemias hipocromas hereditarias, gravedad variable
- Disminución o ausencia de polipéptidos de las cadenas de la Hb, con estructura generalmente normal
- Genes muy extendidos: mediterráneo, África, medio oriente, india, sureste asiático.

Presentación

- Formas homocigotas de alfa o beta talesemia cursan con anemias hemolíticas graves en los primeros meses de vida
- Betatalasemia heterocigótica (rasgo) es muy frecuente; VCM, Hb y CHCM discretamente por debajo de lo normal, no requiere tratamiento

Evolución

- Zonas geográficas donde talasemias y drepanocitosis son prevalentes se superponen con zonas donde paludismo solía ser endémico
- Selección natural, talasemias conferían mayor supervivencia

Manejo

- Evitar hematopoyesis extramedular
- Transfusiones
- Quelantes de Fe^{+}
- Ácido fólico 1-2 mg / día
- Esplenectomía
- Trasplante células hematopoyéticas

Deficit G6P

Generalidades

- Se puede presentar como una anemia hemolítica episódica, inducida por drogas o infecciones
- Anemia hemolítica crónica espontánea
- Cromosoma X
- Mujeres heterocigotas: protección frente a paludismo

Desencadenantes

- Fármacos: Sulfamidas, cotrimoxazol, ácido nalidixico, nitrofurantoína, antimaláricos, aspirina.
- Alimentos: habas
- Infecciones

Manejo

- Ictericia neonatal: ft + exanguineo transfusión
- Evitar/ remover desencadenantes
- Hidratación en crisis hemolíticas
- Transfusión

Anemias hemolíticas inmunes

Generalidades

- Pueden ser isoinmunes (RN)
- Pueden ser autoinmunes; se dividen idiopáticas y secundarias a infecciones (Epstein Barr, Mycoplasma spp), autoinmunes, inmunodeficiencias, tumores y fármacos.

Presentación

- Más frecuente forma episódica, con factor reconocible (infección) y buena respuesta a corticoides, con recuperación completa
- La forma crónica tiene una respuesta variable a corticoides

Manejo

- Grupo de condiciones de rara presentación en pediatría
- Pocos estudios de tamaño adecuado (la mayoría casos anecdóticos)
- Manejo controversial
- Rituximab, corticoides, transfusiones

Consideraciones finales

Criterios de derivación

- Mayores de 3 años
- Sin respuesta a tratamiento inicial
- Anemias severas
- Compromiso de otras series del hemograma

Repaso

Tabla I. Valores hematológicos normales en niños y adolescentes en sangre periférica

Edad	Hb (g/dl)		Hcto (%)		Hematíes (millones/ μ l)		VCM (fl)		HCM (pg)		CHCM (g/dl)	
	Media	-2 DE	Media	-2 DE	Media	-2 DE	Media	-2 DE	Media	-2 DE	Media	-2 DE
Nacimiento*	16,5	13,5	51	42	4,7	3,9	108	98	34	31	33	30
1-3 días	18,5	14,5	56	45	5,3	4,0	108	95	34	31	33	29
1 semana	17,5	13,5	54	42	5,1	3,9	107	88	34	28	33	28
2 semanas	16,5	12,5	51	39	4,9	3,6	105	86	34	28	33	28
1 mes	14,0	10,0	43	31	4,2	3,0	104	85	34	28	33	29
2 meses	11,5	9,0	35	28	3,8	2,7	96	77	30	26	33	29
3-6 meses	11,5	9,5	35	29	3,8	3,1	91	74	30	25	33	30
6-24 meses	12,0	10,5	36	33	4,5	3,7	78	70	27	23	33	30
2-6 años	12,5	11,5	40	35	4,6	3,9	81	75	27	24	34	31
6-12 años	13,5	11,5	40	35	4,6	4,0	86	77	29	25	34	31
12-18 años												
Mujer	14,0	12,0	41	36	4,6	4,1	90	78	30	25	34	31
Varón	14,5	13,0	43	37	4,9	4,5	88	78	30	25	34	31

*Sangre de cordón. CHCM: concentración de la hemoglobina corpuscular media; DE: desviación estándar; Hb: hemoglobina; HCM: hemoglobina corpuscular media; Hcto: hematócrito; VCM: volumen corpuscular medio. Adaptado de: Nathan DG, Oski FA. *Hematology of Infancy and Childhood*. 4th ed. Philadelphia: PA WB Saunders; 1993. p. 352 y *The Harriet Lane Handbook*. St Louis: Mosby; 1993. p. 231.

Tabla II. Tipos de anemias según criterios morfológicos y fisiopatológicos

Morfología	Tipos de anemia			
Anemias microcíticas	– Anemias ferropénicas. Talasemias. Enfermedad crónica (infección, cáncer, inflamación, enfermedad renal)			
Anemias normocíticas	– Disminución de la producción	– Anemia aplásica adquirida/congénita. – Aplasia eritroide pura: síndrome de Diamond-Blackfan, eritroblastopenia transitoria. – Sustitución de la médula ósea: leucemia, tumores, enfermedades de depósito, osteopetrosis, mielofibrosis.		
	– Hemorragia			
	– Secuestro			
	– Hemólisis	– Alteraciones intrínsecas de los hematíes	– Hemoglobinopatías. – Enzimopatías – Trastornos de la membrana: esferocitosis hereditaria	
		– Alteraciones extrínsecas de los hematíes	– Inmunitarias – Toxinas – Infecciones – Microangiopáticas: CID, síndrome hemolítico-urémico	
Anemias macrocíticas	– Déficit de ácido fólico, vitamina B ₁₂ . Hipotiroidismo			

CID: coagulación intravascular diseminada.

Tabla III. Orientación diagnóstica a partir de los signos observados en el examen físico

Órgano/sistema	Signo	Orientación diagnóstica
Piel	Hiperpigmentación	Anemia de Fanconi
	Petequias, púrpura	Anemia hemolítica autoinmune con trombopenia, síndrome hemolítico-urémico, aplasia médula ósea, infiltración de la médula ósea
	Ictericia	Anemia hemolítica, hepatitis, anemia aplásica
Cara	Prominencias óseas malar y maxilar	Anemias hemolíticas congénitas, talasemia mayor
Ojos	Microcórnea	Anemia de Fanconi
	Anomalías de los vasos conjuntivales y retinianos	Hemoglobinopatías
	Cataratas	Deficiencia de G6PD, galactosemia y anemia hemolítica
	Edema de párpados	Malnutrición y déficit de hierro, nefropatía
Boca	Glositis	Deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B ₁₂
Tórax	Anomalías de los músculos pectorales	Síndrome de Poland
Manos	Pulgar trifalángico	Aplasia de la serie roja
	Hipoplasia de la eminencia tenar	Anemia de Fanconi
	Anomalías en las uñas	Deficiencia de hierro
Bazo	Esplenomegalia	Anemia hemolítica, leucemia/linfoma, infección aguda

G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa.

Índice de producción reticulocitaria (IPR)

$$\text{Reticulocitos (corregidos)} = \frac{\text{Reticulocitos real (\%)} \times \text{hematócrito real}}{\text{Hematócrito normal para la edad/sexo}}$$

$$\text{Índice de producción reticulocitaria (IPR)} = \frac{\text{Reticulocitos corregidos (\%)}}{\text{Vida media del reticulocito (días)}}$$

$$\text{Índice de producción reticulocitaria (IPR)} = \frac{\text{Reticulocitos real (\%)} \times \text{hematócrito real}}{\text{Hematócrito normal} \times \text{Vida media del reticulocito (días)}}$$

Vida media del reticulocito (según el hematócrito)

Hcto	Días
45	1
35	1,5
25	2
15	2,5

Figura 1. Fórmula para el ajuste de la cifra de reticulocitos a la masa eritrocitaria real de cada paciente.

Tabla IV. Algoritmo

Anemia

Hb, IPR, VCM, CHCM

Respuesta inadecuada: IPR < 2

Microcítica, hipocrómica

- Déficit de hierro:
 - Pérdida sanguínea crónica
 - Dieta inadecuada
 - Intolerancia a PLV
 - Menstruación
- Talasemia:
 - Beta: mayor, menor
 - Alfa: menor
- Enfermedad inflamatoria crónica
- Déficit de cobre
- Anemia sideroblástica
- Intoxicación por aluminio, plomo (¿)
- Otras

Normocítica, normocrómica

- Enfermedad inflamatoria crónica:
 - Infección
 - Enfermedad vascular del colágeno
 - Enfermedad intestinal inflamatoria
- Pérdida de sangre reciente
- Insuficiencia renal crónica
- Eritroblastopenia transitoria de la infancia
- Aplasia/hipoplasia de la MO
- Infección por VIH
- Síndrome hemofagocítico

Macrocítica

- Déficit de vitamina B₁₂:
 - Anemia perniciosa
 - Resección ileal
 - Vegetarianismo estricto
 - Alteraciones transporte intestinal
 - Déficit congénito de transcobalamina
- Déficit de folato:
 - Malnutrición
 - Malabsorción
 - Antimetabolitos
 - Hemólisis crónica
 - Fenitoína
 - Cotrimoxazol
- Hipotiroidismo
- Hepatopatía crónica
- Síndrome de Down
- Síndrome de Lesch-Nyhan
- Insuficiencia de MO:
 - Mielodisplasia
 - Anemia de Fanconi
 - Anemia aplásica
 - Síndrome de Blackfan-Diamond
 - Síndrome de Pearson
- Drogas:
 - Alcohol
 - Zidovudina

Respuesta adecuada: IPR ≥ 3

Trastornos hemolíticos

- Hemoglobinopatías: Hb SS, S-C, S-betatalasemia
- Enzimas:
 - Déficit de G6PD
 - Déficit de PK
- Membranopatía:
 - Esferocitosis congénita
 - El ptocitosis
- Factores extrínsecos:
 - CID, SHU, PTT
 - Quemaduras
 - Abetalipoproteinemia
 - Enf. de Wilson
 - Déficit de vit. E
- Anemia hemolítica inmunitaria

CHCM: concentración de Hb corpuscular media; CID: coagulación intravascular diseminada; G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa; Hb: hemoglobina; IPR: índice de producción reticulocitaria; MO: médula ósea; PK: piruvato-kinasa; PLV: proteínas de leche de vaca; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SHU: síndrome hemolítico urémico; VCM: volumen corpuscular medio.
Adaptado de: Kliegman RM, Marcante KJ, Jenson HJ, et al. Nelson. Essentials of Pediatrics. 5ª ed. Filadelfia: Elsevier/Saunders; 2006. p. 694.

“Muchas gracias”